Talisma

品種名：Talisma	縫合線：淺
來源：巴西	果頂形狀：稍尖
樹姿：開張	對稱性：對稱
樹勢：強	果皮顏色：底色黃綠,著紅暈
開花期：1月下旬	表皮絨毛：有
成熟期：6月中旬	皮剝離難易：熟果可剝皮
葉型：長橢圓披針形	果肉顏色：白色
葉色：綠色	果肉質地：軟溶質
一年生枝條顏色：紅褐色	果肉與核之粘離：離核
葉緣形狀：鈍鋸齒狀	平均果重 (g)：172.9
葉尖形狀：漸尖	可溶性固形物 (°Brix)：13.5
葉基部形狀：楔形	可滴定酸(%)：0.2
腺體：腎形	產量：豐產
花型：薔薇型,單瓣	核顏色：紅色
花色：粉紅色	核形狀：橢圓形
果型：桃形	用途：鮮食

TropicBeauty

品種名：TropicBeauty
來源：佛羅里達
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：1月下旬
成熟期：5月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇型,單瓣
花色：粉紅色
果型：近圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：稍不對稱
果皮顏色：底色黃,著紅暈
表皮絨毛：有
皮剝離難易：難剝皮
果肉顏色：黃色帶紅色
果肉質地：軟溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：145
可溶性固形物 (˚Brix)：12.7
可滴定酸(%)：0.75
產量：豐產
核顏色：玫瑰紅
核形狀：卵形
用途：鮮食

TropicSnow

品種名：TropicSnow
來源：佛羅里達
樹姿：半開張
樹勢：中等
開花期：1月下旬
成熟期：5月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇型,單瓣
花色：粉紅色
果型：圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：稍不對稱
果皮顏色：底色白,著紅暈
表皮絨毛：有
皮剝離難易：熟果可剝皮
果肉顏色：白色
果肉質地：軟溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：130.5
可溶性固形物 (°Brix)：9.2
可滴定酸(%)：0.80
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：長卵形
用途：鮮食

Tutu

品種名：Tutu
來源：巴西
樹姿：半開張
樹勢：中庸
開花期：2月中旬
成熟期：6月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形

縫合線：不明顯
果頂形狀：圓凸
對稱性：不對稱
果皮顏色：底色白,著紅暈
表皮絨毛：短
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：全白肉
果肉質地：溶質,肉質細,多汁
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：105
可溶性固形物 (˚Brix)：12.5
可滴定酸(%)：0.22
產量：中等
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

桃 Peach

UFGold

品種名：UFGold	縫合線：淺
來源：佛羅里達	果頂形狀：圓,微凹
樹姿：開張	對稱性：對稱
樹勢：中等	果皮顏色：紅色
開花期：1月下旬	表皮絨毛：有
成熟期：4月中下旬	皮剝離難易：難
葉型：長橢圓披針形	果肉顏色：黃色
葉色：綠色	果肉質地：不溶質
一年生枝條顏色：綠褐色	果肉與核之粘離：黏核
葉緣形狀：鈍鋸齒狀	平均果重 (g)：95
葉尖形狀：漸尖	可溶性固形物 (˚Brix)：13.1
葉基部形狀：楔形	可滴定酸(%)：0.53
腺體：腎形	產量：豐產
花型：薔薇型,單瓣	核顏色：褐色
花色：粉紅色	核形狀：倒卵形
果型：圓形	用途：鮮食

UFO

品種名：UFO
來源：佛羅里達
樹姿：半開張
樹勢：中等
開花期：1月下旬
成熟期：5月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：鈴形,單瓣
花色：粉紅色
果型：扁平
縫合線：明顯
果頂形狀：頂凹
對稱性：稍不對稱
果皮顏色：底色黃,有紅斑
表皮絨毛：有
皮剝離難易：不易剝皮
果肉顏色：黃色帶紅
果肉質地：不溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：120
可溶性固形物 (˚Brix)：13.3
可滴定酸(%)：0.51
產量：中等
核顏色：木黃色
核形狀：扁圓形
用途：鮮食

UFQueen

品種名：UFQueen
來源：佛羅里達
樹姿：開張
樹勢：中等
開花期：1月下旬
成熟期：5月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：鈴形,單瓣
花色：粉紅色
果型：圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：紅色,熟果暗紅色
表皮絨毛：有
皮剝離難易：不易剝皮
果肉顏色：黃色
果肉質地：不溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：100
可溶性固形物 (˚Brix)：14.4
可滴定酸(%)：0.6
產量：中等
核顏色：木黃色
核形狀：橢圓形
用途：鮮食

福州大桃

品種名：福州大桃
來源：台灣
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：1月下旬
成熟期：7月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形, 單瓣
花色：粉紅色
果型：尖圓形
縫合線：明顯
果頂形狀：稍尖
對稱性：對稱
果皮顏色：底色淡黃,著紅暈
表皮絨毛：有
皮剝離難易：難剝皮
果肉顏色：白色
果肉質地：硬肉
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：153.1
可溶性固形物 (°Brix)：11.1
可滴定酸(%)：0.5
產量：豐產
核顏色：紅色
核形狀：長卵形
用途：鮮食

福壽桃

品種名：福壽桃
來源：台灣
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：1月下旬
成熟期：6月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖

葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形, 單瓣
花色：粉紅色
果型：尖圓形
縫合線：明顯
果頂形狀：稍尖
對稱性：稍對稱
果皮顏色：底色白,全面淡紅
表皮絨毛：有
皮剝離難易：可剝皮

果肉顏色：白色帶淡紅色
果肉質地：硬肉
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：130
可溶性固形物 (˚Brix)：13.4
可滴定酸(%)：0.72
產量：豐產
核顏色：紅色
核形狀：卵形
用途：加工，鮮食

鶯歌桃

品種名：鶯歌桃
來源：台灣
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：1月下旬
成熟期：6月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：圓形或腎形
花型：薔薇形, 單瓣
花色：粉紅色
果型：圓形,頂尖

縫合線：明顯
果頂形狀：頂尖稍彎曲
對稱性：不對稱
果皮顏色：底色淡黃,著紅暈
表皮絨毛：有
皮剝離難易：難剝皮
果肉顏色：白色,近核帶紅
果肉質地：硬肉
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：130
可溶性固形物 (˚Brix)：14.5
可滴定酸(%)：0.68
產量：豐產
核顏色：紅色
核形狀：長卵形
用途：鮮食,加工

早紅桃

品種名：早紅桃
來源：佛羅里達，原名Maravilha，
又名三月桃
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：2月上旬
成熟期：5月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇型,單瓣
花色：粉紅色
果型：圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凸
對稱性：對稱
果皮顏色：紅色
表皮絨毛：有
皮剝離難易：熟果可剝皮
果肉顏色：白色
果肉質地：軟溶質

果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：89.6
可溶性固形物 (˚Brix)：14.8
可滴定酸(%)：1.03
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：寬卵形
用途：鮮食，台灣作為加工

台農甜蜜

品種名：台農甜蜜
來源：巴西，原名Premier
樹姿：半直立
樹勢：強
開花期：1月下旬
成熟期：5月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形, 單瓣
花色：粉紅色
果型：近圓形
縫合線：淺
果頂形狀：稍尖
對稱性：對稱
果皮顏色：紅色
表皮絨毛：有
皮剝離難易：難
果肉顏色：白色帶紅色
果肉質地：軟溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：100
可溶性固形物 (°Brix)：13.3
可滴定酸(%)：0. 12
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：寬卵形
用途：鮮食

桃 Peach

品種名：春蜜
來源：桃台農1號
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：1月下旬
成熟期：5月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形, 單瓣
花色：粉紅色
果型：近圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凸
對稱性：稍對稱
果皮顏色：紅
表皮絨毛：有
皮剝離難易：可剝皮
果肉顏色：白色
果肉質地：溶質

果肉與核之粘離：半離核
平均果重 (g)：130
可溶性固形物 (˚Brix)：11.2
可滴定酸(%)：0. 42
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：橢圓形
用途：鮮食

紅玉

品種名：紅玉
來源：桃台農4號
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：1月中旬
成熟期：4月下旬-5月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面呈紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形, 單瓣
花色：粉紅色
果型：圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓
對稱性：對稱
果皮顏色：暗紅色
表皮絨毛：有
皮剝離難易：難
果肉顏色：白色
果肉質地：不溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：100
可溶性固形物 (°Brix)：13.3
可滴定酸(%)：0.31
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：橢圓形
用途：鮮食

桃 Peach

江西九號

品種名：江西九號
來源：大陸
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：卵圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：2-4個,腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：橢圓形

縫合線：淺,明顯
果頂形狀：圓凸
對稱性：對稱
果皮顏色：底色乳白,著紅暈
表皮絨毛：短
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白肉,近核處有少量紅色
果肉質地：肉質細密,多汁,溶質
果肉與核之粘離：半離核
平均果重 (g)：181
可溶性固形物 (˚Brix)：9.3
可滴定酸(%)：0.09
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

江西924

品種名：江西924
來源：大陸
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：近圓形

縫合線：明顯
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：底色淡黃,著紅暈
表皮絨毛：長
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白肉,近核處有少量紅色
果肉質地：肉質細緻,纖維長
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：184
可溶性固形物 (°Brix)：11.7
可滴定酸(%)：0.31
產量：豐產
核顏色：紅褐色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

江西雪雨露

品種名：江西雪雨露
來源：大陸
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月上旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：橢圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓凸
對稱性：不對稱
果皮顏色：底色淺黃,著紅暈
表皮絨毛：中等
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白色
果肉質地：肉質細,汁液中等
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：141.5
可溶性固形物 (°Brix)：7.1
可滴定酸(%)：0.27
產量：中等
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵形
用途：鮮食



紅月

品種名：紅月
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月上旬
成熟期：7月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：底色乳白色,帶紅暈
表皮絨毛：短,細
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白色,近核有少量紅色
果肉質地：肉質細,汁液多,溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：176.6
可溶性固形物 (˚Brix)：11
可滴定酸(%)：0.17
產量：豐產
核顏色：紅色
核形狀：橢圓形
用途：鮮食

紅清水

品種名：紅清水
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月上旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：紅色
表皮絨毛：短,細
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白色,近核處帶紅色
果肉質地：肉質細,汁液多,溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：154.5
可溶性固形物 (°Brix)：11.9
可滴定酸(%)：0.13
產量：中等
核顏色：紅色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

千曲

品種名：千曲
來源：日本
樹姿：半開張
樹勢：中庸
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：底色乳白色著紅暈
表皮絨毛：短
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白肉
果肉質地：多汁,纖維中粗,溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：155.6
可溶性固形物 (°Brix)：15.1
可滴定酸(%)：0.16
產量：偏低
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

興津

品種名：興津
來源：為日本農林省園藝試場的谷川利善於1917年用'Precoce de Croncels'和'Lord Napier'雜交選育而成
樹姿：半開張
樹勢：中庸
開花期：4月上旬
成熟期：7月下旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：深綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：廣楔形
腺體：圓形
花型：薔薇形
花色：淺粉紅色
果型：橢圓形縫合線：明顯
果頂形狀：圓凸
對稱性：對稱
果皮顏色：底色黃,著紅暈
表皮絨毛：無
皮剝離難易：皮薄,不易剝離
果肉顏色：淺黃,近核處有紅色
果肉質地：較粗,纖維和汁液中等,為溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：295
可溶性固形物 (˚Brix)：12.1
可滴定酸(%)：0.61
產量：中等
核顏色：木黃色
核形狀：長卵形
用途：鮮食

曉

品種名：曉
來源：日本農林省果樹試驗場以'白桃'與'白鳳'為親本,雜交選育而成
樹姿：半開張
樹勢：強健
開花期：4月上旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：深綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面呈褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形
縫合線：中深
果頂形狀：平
對稱性：較不對稱
果皮顏色：底色白,向陽面有暗紅色斑和不明顯條紋
表皮絨毛：中多
皮剝離難易：皮中厚,易剝離
果肉顏色：白色,近核處帶紅色
果肉質地：略粗,纖維較多,汁多,為溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：176.5
可溶性固形物 (°Brix)：16.3
可滴定酸(%)：0.20
產量：豐產
核顏色：紅色
核形狀：倒卵形
用途：鮮食

桃 Peach

曉星

品種名：曉星
來源：日本
樹姿：半開張
樹勢：中等
開花期：3月中旬
成熟期：6月下旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：深綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：紅色
表皮絨毛：細短
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白色,近核帶淺粉紅色
果肉質地：纖維較多,汁液多
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：122.9
可溶性固形物 (˚Brix)：15.9
可滴定酸(%)：0.23
產量：豐產
核顏色：褐色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

純白

品種名：純白
來源：日本
樹姿：半開張
樹勢：中等
開花期：3月上旬
成熟期：6月下旬-7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：深綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面呈紅褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：近圓形
縫合線：中深
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：稍不對稱
果皮顏色：底色淡黃,著紅暈
表皮絨毛：中長
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白色帶淡粉紅
果肉質地：細,纖維中粗
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：196.3
可溶性固形物 (˚Brix)：10.9
可滴定酸(%)：0.32
產量：豐產
核顏色：紅色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食



血桃

品種名：血桃
來源：大陸
樹姿：張開
樹勢：強健
開花期：3月上旬
成熟期：7月下旬
葉型：披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：白色
果型：近圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓凸
對稱性：對稱
果皮顏色：暗紫色
表皮絨毛：中等
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白色帶大量紅色
果肉質地：脆,為硬肉桃
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：250
可溶性固形物 (˚Brix)：10.2
可滴定酸(%)：0.33
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

上海水蜜

品種名：上海水蜜
來源：大陸
樹姿：半開張
樹勢：中等
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：廣楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：綠白色,有紅色細點
表皮絨毛：中等
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白色,近核處紅色
果肉質地：柔軟,纖維少,汁多
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：183.7
可溶性固形物 (˚Brix)：11.4
可滴定酸(%)：0.52
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食